

Screenodling för påvisande av MRSA hos personal i patientnära vårdarbete

Bakgrund

Riktlinjen avser åtgärder för att personal inom vården som bär på MRSA identifieras och handläggs så att man förebygger spridning av Meticillinresistent *Staphylococcus aureus* (MRSA). Personal screenas inte för övriga multiresistenta bakterier (MRB).

Screeningen omfattar personal som deltar i patientnära vårdarbete. Patientnära vårdarbete definieras som arbete i rum där patienter undersöks, behandlas eller vårdas. Vårdstuderande, korttidsanställda samt gästande vårdpersonal som deltar i vårdnära arbete omfattas också av dessa riktlinjer

Riktlinjen följer socialstyrelsens [”Rekommendation för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA”](#)

MRSA-provtagning utförs alltid hos vårdpersonal som

- under det senaste 6 månaderna arbetat eller varit inlagd på sjukhus, annan vårdinrättning alternativt fått sjukvårdande behandling* i öppenvård utanför Norden eller inom område i Sverige med särskild MRSA-problematik.
[Se ”Aktuella områden för screening av multiresistenta bakterier”.](#)

* Med sjukvårdande behandling menas t ex såromläggning, dialys, suturering, insättande av venkateter, shunt eller urinkateter men inte enklare undersökningar t.ex. blodprovstagning och blodtrycksmätning.

MRSA-provtagning ska utföras i samråd med vårdhygienisk expertis eller smittskydd i följande fall:

- av vårdpersonal som har nära kontakt med MRSA-bärare inom det egna hushållet/familjen
- vid ett oväntat fynd av MRSA hos en patient ska man utföra screenodling av den personal på vårdenheten som har individberoende riskfaktorer**
- vid MRSA-spridning på en vårdenhet

MRSA-provtagning behöver inte utföras rutinmässigt när **hudfrisk personal** vårdar eller har vårdat känd MRSA-bärare om vården följt de fastställda riktlinjerna i regionen för vård av patient med MRB.

**Med individberoende riskfaktorer för MRSA-bärarskap menas sår, eksem eller annan hudlesion eller främmande material som penetrerar hud eller slemhinna såsom infart, stomi, drän, kateter av olika slag samt piercing

Rutiner vid MRSA-provtagning av personal

Var tas provet

- tas i samråd med Företagshälsa Region Gävleborg.

Provställen vid MRSA-provtagning av personal

- främre näsöppning
- svalg
- sår och hudlesioner
- perineum

När tas provet

- före ett arbetspass och helst efter någon dags ledighet
- om provtagning sker under pågående antibiotikabehandling, upprepas provtagningen minst två veckor efter avslutad behandling

Tänk på att

- personal **med individberoende riskfaktorer**** inte får delta i patientnära vårdarbete i väntan på provsvar
- personal utan individberoende riskfaktorer får arbeta i patientnära vårdarbete i väntan på provsvar
- provsvaret ska alltid ställas till den läkare som begärt provtagningen

**Med individberoende riskfaktorer för MRSA-bärarskap menas sår, eksem eller annan hudlesion eller främmande material som penetrerar hud eller slemhinna såsom infart, stomi, drän, kateter av olika slag samt piercing