Region Gävleborg
Smittskydd

Stelkrampsprofylax till vuxna vid sårskada

VACCINERAD MOT STELKRAMP?

Ja

FÅTT 1

Fått **en** dos stelkrampsvaccin:

- Ge humant immunglobulin mot stelkramp, Tetagam (kontakta en akutmottagning) om det gått > 1 dygn sedan skadan, om skadan är mycket förorenad, eller om det inte går att excidera misstänkta föroreningar.
- Ge kombinationsvaccin dos 2 (se faktaruta).
- Säkerställ uppföljning (se faktaruta) med dos 3 efter 6-12 månader.

FÅTT 2

Fått **två** doser stelkrampsvaccin, minst sex månader sedan senaste dosen:

- Ge kombinationsvaccin dos 3 (se faktaruta).

FÅTT 3

Fått **minst tre** doser stelkrampsvaccin, **mer än tio år sedan** senaste dosen:

- Ge kombinationsvaccin dos 4 (se faktaruta).

FÅTT ≥4

Fått **minst fyra** doser stelkrampsvaccin, **mer än 20 år sedan** senaste dosen:

- Ge kombinationsvaccin (se faktaruta).

Nej

- Ge humant immunglobulin mot stelkramp, Tetagam, (kontakta en akutmottagning)
- Ge kombinationsvaccin dos 1 (se faktaruta)
- Säkerställ uppföljning med stelkrampsvaccin (se faktaruta) dos 2 (efter 2 månader) och dos 3 (efter 6-12 månader).

Faktaruta

Rekommenderade kombinationsvacciner

Dos 1–3:
Fyrvalent vaccin (fulldosvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio) upphandlat i Region Gävleborg är Tetravac.

Från och med dos 4:
Trivalent boostervaccin (difteri, stelkramp och kikhosta) med reducerat antigenhalt, upphandlat i Region Gävleborg är Triaxis, alternativt tvåvalent boostervaccin (difteri och stelkramp) med reducerad antigenhalt, diTeBooster.

Postadress
Smittskydd
Gävle sjukhus
801 87 Gävle
Webb: www.regiongavleborg.se/smittskydd
E–post: smittskydd@regiongavleborg.se

Telefon 026-15 53 08

Besöksadress
Ingång 12
Gävle sjukhus